Fisica delle alte energie agli acceleratori: il Modello Standard e oltre

Lezione #4

Ricerca dell'Higgs a LHC

Ricerca dell'Higgs a LHC

2009
 Repair of Sector 34
 Installation of protection systems for 5TeV operation
 Hardware commissioning to 5TeV
 Machine checkout
 Beam commissioning 5TeV

Energy will be limited to 5TeV

(2009-2010)

2010
 43/156 bunch operation
 50ns operation
 25ns operation ?
 Shutdown
 Beam
 No beam

from R. Bailey

April 2009

Interazioni p-p a LHC

Scetch of a proton-proton collision at high energies

Interazione principale

ISR e FSR

Creazione dei Jet

Frammentazione e Adronizzazione

Interazioni Multi Partoniche

Beam Remnant

Underlying Event e Minimum Bias

Sketch of a proton-proton collision at high energies

L'Underlying Event è la parte di evento che accompagna il processo ad alto impulso trasverso

ISR, FSR, Interazioni Multi Partoniche, Parte rimanente del fascio

Oltre al processo p-p che ha prodotto l'evento interessante vi sono anche le interazioni p-p appartenenti allo stesso beam-crossing

Minimum Bias: Scattering inelastico soffice

- Evento osservabile dal rivelatore (Pt minimo ~100 MeV) ← Bias minimo
- Nessuna o poche tracce prodotte ad un Pt significativo (~ 2 GeV)

Scattering Elastico (25%)

Inelastico Non diffrattivo (55%)

Inelastico doppio diffrattivo (8%)

Inelastico singolo diffrattivo (8%)

Da LEP a LHC

LHC: una fabbrica di Higgs, ma in un ambiente un pò ostile...

fondi QCD

$\approx 10^7$

H

$\approx 1/\text{ora}$

Produzione del bosone di Higgs a LHC

SM Higgs production cross section including NLO QCD corrections

Decadimenti del bosone di Higgs

Per masse dell'Higgs sopra 135 GeV i principali modi di decadimento sono:

WW(*) and ZZ(*)

sotto 135 GeV sono b quarks e $\tau^+\tau^-$

Le costanti di accoppiamento del bosone di Higgs ai **fermioni** ed ai **bosoni** sono proporzionali alle masse delle particelle:

$$g_{hf\bar{f}} = \frac{m_f}{v} \propto m_f \quad g_{hVV} = \frac{2m_V^2}{v} \propto M_W$$

$$\left[v = \frac{M_W \sin \theta_W}{\sqrt{\alpha\pi}} \approx 246 \text{ GeV}/c^2 \right]$$

Cioè: **Appena m_H è tale da aprire un nuovo Canale di Decadimento i cui prodotti hanno Masse maggiori, questo diventa il favorito**

Il decadimento in coppie di bosoni vettori risulta dominante rispetto al decadimento in coppie di fermioni a causa della loro maggiore massa.

Confrontando invece le due diverse coppie di bosoni WW e ZZ risulta maggiore per un fattore ~ 3 la coppia con minore massa.

$$g_{hVV} = \frac{2m_V^2}{v} \propto M_W$$

$$\mathcal{L}_{HVV} = \frac{2m_W^2}{v} W_\mu^+ W^{-\mu} H + \frac{m_Z^2}{v} Z^\mu Z_\mu H \equiv g_{m_W} W_\mu^+ W^{-\mu} H + \frac{1}{2} \frac{g_{m_Z}}{\cos \theta_W} Z^\mu Z_\mu H$$

$$BR(h \rightarrow WW) / BR(h \rightarrow ZZ) = g_{hWW}^2 / g_{hZZ}^2 = 4M_W^2 / M_Z^2 \sim 3$$

Larghezza del bosone di Higgs

La larghezza passa da alcuni MeV per basse masse a centinaia di GeV per alte masse a causa della dipendenza da m_H^3 dell'accoppiamento $H \rightarrow VV$

Fermions:
$$\Gamma_f = \frac{g^2}{32\pi m_W^2} m_f^2 m_H N_c (1 - x_f), \quad \text{where } x_f = \left(\frac{2m_f}{m_H}\right)^2$$

$N_c=3$ for quarks and $=1$ for leptons.

WW:
$$\Gamma_{WW} = \frac{g^2}{64\pi m_W^2} m_H^3 \sqrt{1 - x_W} \left(1 - x_W + \frac{3}{4} x_W^2\right), \quad \text{where } x_W = \left(\frac{2m_W}{m_H}\right)^2$$

ZZ:
$$\Gamma_{ZZ} = \frac{1}{2} \frac{g^2}{64\pi m_Z^2} m_H^3 \sqrt{1 - x_Z} \left(1 - x_Z + \frac{3}{4} x_Z^2\right), \quad \text{where } x_Z = \left(\frac{2m_Z}{m_H}\right)^2$$

Γ_{ZZ} has a factor of two penalty in phase space in comparison to Γ_{WW}
 (Z and Z are indistinguishable in comparison to W^+ and W^-)

Canali di ricerca del bosone di Higgs a LHC

Vedremo in dettaglio i principali canali di scoperta dell'Higgs:

$H \rightarrow ZZ \rightarrow 4l$ $H \rightarrow WW \rightarrow 2l$ $H \rightarrow \gamma\gamma$ nelle due componenti di fusione gg e VBF
e le produzioni associate (Ex. $qq \rightarrow ttH$, $H \rightarrow bb$)

La ricerca dell'Higgs al Tevatron orienterà la ricerca dell'Higgs ad LHC verso i canali che danno accesso alle masse non ancora escluse al 95%.

$$H \rightarrow ZZ^{(*)} \rightarrow 4\ell$$

Distribuzione della massa invariante per il canale $H \rightarrow ZZ \rightarrow 4\mu$ per una luminosità integrata di 20 fb^{-1} per il segnale (5 diverse masse) e per i principali fondi.

È stata applicata la semplice preselezione di evento rivelabile:

$$|\eta| < 2.5 \quad p_t < 3 \text{ GeV}$$

Distribuzione della massa invariante per i canali:

$$H \rightarrow ZZ \rightarrow 4e$$

$$H \rightarrow ZZ \rightarrow 4\mu$$

$$H \rightarrow ZZ \rightarrow 2e2\mu$$

per una luminosità integrata di 1 fb^{-1} per il segnale (4 diverse masse)

e per i principali fondi con i seguenti criteri di selezione:

- Isolamento di elettroni e muoni
- Parametro di impatto IP/σ_{IP} (4° peggiore) < 12 (se muone) 5 (se elettrone)
(3° peggiore) < 4
- p_t (min) $> 5 \text{ GeV}$ (muoni) 7 GeV (elettroni)
- M_Z tra 50 e $100 \text{ GeV}/c^2$ M_{Z^*} tra 20 e $100 \text{ GeV}/c^2$

Nel passaggio da 14 TeV a 10 TeV la sezione d'urto del segnale si riduce del 50% mentre quella del fondo ZZ solo del 30%.

CMS Week

H → WW (*) → 2ℓ2ν

Segnale

Il segnale è caratterizzato da:

- 2 leptoni isolati ad alto Pt
- missing Et
- assenza di high energy Jet
- correlazione angolare tra WW

gluon fusion: gg → H

VBF: qq → qqH

Fondo

Produzione di coppie WW

t $\bar{t}$

Wt

DY

L'analisi si suddivide nei tre canali:

$$H \rightarrow WW \rightarrow 2e2\nu$$

$$H \rightarrow WW \rightarrow 2\mu 2\nu$$

$$H \rightarrow WW \rightarrow e\mu 2\nu$$

è stata valutata anche l'utilità di tenere separati i canali $e\mu$ μe ordinati in $p_t(\max)$.

Nel PTDR si è mostrato come un'analisi basata su tagli in P_t ,

Isolamento, Energia mancante e Jet-veto permetta di ottenere un chiaro

segnale nella zona $\phi_{ll} < 45^\circ$ per Higgs con massa intorno a 165 GeV

La differente distribuzione dell'angolo tra i due leptoni per WW provenienti da Higgs e da fondo deriva dalla correlazione di spin e dalla struttura V-A del decadimento del W.

Per $M_H \leq 2 M_W$ i bosoni W sono prodotti con basso boost (seguono entrambi la direzione dell'Higgs)

Inoltre, nel riferimento dell'Higgs, avranno direzioni opposte ma anche spin opposti, i leptoni del decadimento del W tenderanno ad avere la stessa direzione.

mH (GeV)	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NS	4.9	8.7	18	9	21	17	11	5.6	4.6
NB	87	87	87	17	17	17	13.5	13.5	13.5

Per basse masse, pur ottimizzando diversamente i tagli, il rapporto segnale / rumore peggiora sensibilmente. Risulta fondamentale l'ultizzo di analisi a Multivariabili che sfruttano pianamente la differente distribuzione tra segnale e fondo delle variabili.

CMS AN 2008/039

Dottorato in Fisica XXIV Ciclo

Stima della luminosità integrata necessaria per l'esclusione al 95% CL_{int} per il canale $\mu\mu$ nella fase iniziale con energia di 10 TeV

HWW meeting

15/5/2009

Process	$\frac{\sigma_{\sqrt{s}=10\text{TeV}}}{\sigma_{\sqrt{s}=14\text{TeV}}}$	$\frac{\sigma_{\sqrt{s}=6\text{TeV}}}{\sigma_{\sqrt{s}=14\text{TeV}}}$
$t\bar{t}$	0.450	0.113
Wt	0.450	0.113
WW	0.650	0.320
WZ	0.650	0.320
ZZ	0.650	0.320
$Z \rightarrow \ell\ell$	0.681	0.371
$W \rightarrow \ell\nu$	0.681	0.371
$gg \rightarrow H$	0.540	0.190

Anche il canale $H \rightarrow WW$ risulta penalizzato a 10 TeV. La sezione d'urto del segnale si riduce del 50%, quella del fondo WW solo del 35%.

HWW meeting

23/1/2009

Ezio Torassa

Dottorato in Fisica XXIV Ciclo

H → γγ

Dato che il fotone non ha massa non c'è accoppiamento diretto con il bosone di Higgs.

Il decadimento in fotoni è comunque possibile mediante i seguenti diagrammi:

M_H	115 GeV/c ²	120 GeV/c ²	130 GeV/c ²	140 GeV/c ²	150 GeV/c ²
σ (gg fusion)	39.2 pb	36.4 pb	31.6 pb	27.7 pb	24.5
σ (WVB fusion)	4.7 pb	4.5 pb	4.1 pb	3.8 pb	3.6
σ (WH, ZH, ttH)	3.8 pb	3.3 pb	2.6 pb	2.1 pb	1.7
Total σ	47.6 pb	44.2 pb	38.3 pb	33.6 pb	29.7
H → γγ Branching Ratio	0.00208	0.00220	0.00224	0.00195	0.00140
Inclusive $\sigma \times B.R.$	99.3 fb	97.5 fb	86.0 fb	65.5 fb	41.5 fb

BR ≈ 10⁻³
 $\sigma * BR \approx 90 \text{ fb}$

Fondi :

– $\gamma\gamma$ (irriducibile):

$gg \rightarrow \gamma\gamma$ (box diagram)

$qq \rightarrow \gamma\gamma$ (born diagram)

$pp \rightarrow \gamma + \text{jets}$ (2 prompt γ)

$$\sigma_{\gamma\gamma} \approx 2 \text{ pb} / \text{GeV}$$

$$\Gamma_H \approx \text{MeV}$$

– $\gamma + \text{jet}$, $\text{jet} + \text{jet}$ (riducibile):

$pp \rightarrow \gamma + \text{jets}$ (1 prompt γ + 1 fake γ)

$pp \rightarrow \text{jets}$ (2 fake γ)

$pp \rightarrow ee$ (Drell Yan) when electrons are mis-identified as photons

$$\sigma_{\gamma j + j j} \sim 10^6 \sigma_{\gamma\gamma}$$

- Selezione :

- 2 fotoni con energia trasversa maggiore di 35 GeV e 40 GeV
- Nessuna traccia con $P_t > 1.5$ GeV in un cono $\Delta R < 0.4$ intorno ad ogni fotone
- $E_t < 6$ GeV in HCAL in un cono $\Delta R < 0.3$ intorno ad ogni fotone
- $E_t < 6$ GeV in ECAL (escluso il cluster del fotone candidato) in un cono $\Delta R < 0.35$ intorno ad ogni fotone

Distribuzione di massa invariante dopo la selezione (segnale x 10) normalizzata a 1fb^{-1}

Analisi ottimizzata: 6 variabili in ingresso di una rete neurale

ttH → ttbb

- $\sigma \times \text{BR} \approx 300 \text{ fb}$
- Stato finale complesso: $H \rightarrow b\bar{b}$, $t \rightarrow bj\bar{j}$, $t \rightarrow b\ell\nu$

$\ell = e, \mu$ per trigger e background rejection

- fondi principali:
 - combinatori dal segnale (4b in stato finale)
 - Wjjjjjj, WWbbjj, etc.
 - ttj

Ridotto,
ricostruendo
entrambi i top

b-tagging è cruciale

CMS AN 2007/001

Ezio Torassa

	N_{loose}^{ev}	N_{tight}^{ev}
$t\bar{t}H$ (115)	147 ± 5	48 ± 3
$t\bar{t}H$ (120)	118 ± 2	40 ± 1
$t\bar{t}H$ (130)	80 ± 3	25 ± 2
Total Backgr.	2230	427

Eventi attesi di segnale (per 3 differenti masse) e di fondo con 60 fb^{-1} di luminosità integrata e due diverse selezioni (loose e tight) di b-Tag

	S/B	$S/\sqrt{B}$	$S/\sqrt{B + dB^2}$
ϵ_{loose}			
$t\bar{t}H$ ($m_H=115 \text{ GeV}/c^2$)	0.07	3.1	0.20
$t\bar{t}H$ ($m_H=120 \text{ GeV}/c^2$)	0.053	2.5	0.16
$t\bar{t}H$ ($m_H=130 \text{ GeV}/c^2$)	0.036	1.7	0.11
ϵ_{tight}			
$t\bar{t}H$ ($m_H=115 \text{ GeV}/c^2$)	0.11	2.3	0.35
$t\bar{t}H$ ($m_H=120 \text{ GeV}/c^2$)	0.09	1.9	0.29
$t\bar{t}H$ ($m_H=130 \text{ GeV}/c^2$)	0.06	1.2	0.19

Significatività con stima dell'errore sistematico sul fondo pari a circa il 30%.

Per rapporti S/B pari a $1/10$ l'errore sulla conoscenza del fondo deve essere ridotto a meno del 10% per fornire significatività maggiori di 1.

Ricerca dell'Higgs a LEP II :

Search for the Standard Model Higgs Boson at LEP – CERN-EP/2003- 011

Ricerca dell'Higgs a LHC:

CMS IN-2003/046 Search for the Standard Model Higgs Boson in Four-Muon Final State
with the CMS Detector

CMS AN 2008/050 Search strategy for the Higgs boson in the $ZZ^{(*)}$ decay channel with the
CMS experiment

CMS AN 2008/039 Search strategy for a standard model Higgs boson decaying to two W bosons
in the fully leptonic final state

CMS AN 2007/001 Refined analysis of $t\bar{t}H$ with $H \rightarrow b\bar{b}$ at CMS

CMS Physics TDR, Volume II: [CERN-LHCC-2006-021](#), 25 June 2006